

Okul yaş dönemi çocuğu olan ebeveynlerin hastalık ve hastaneye yatma durumunda “Ebeveynlerin endişe kaynakları ölçeği”nin geliştirilmesi ve “Çocukların endişe kaynakları” ile etkileşimi

Improvement of “Parental anxiety resources scale” under conditions of disease and hospitalization of school age children and influence over “Children anxiety resources”

Demet Gönerer¹, Hatice Pek²

¹Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sinop

²Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Emekli öğretim üyesi, İstanbul

Düzeltilme

Gaziantep Tıp Dergisi'nin 2009 yılı 15. cilt 1. sayı 31-40. sayfalarında basılan yayının yazarı H. Demet Cabar (Gönerer)'in isteği üzerine makale aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

Araştırmada kullanılan Beck Anksiyete Envanteri (BAE) kullanımında; “Savaşır I, Şahin N. Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Özyurt Matbaası, Ankara, 1997;67-71” kaynağından yararlanılmıştır.

Spielberger Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri (SDSKE) kullanımında; “Alparslan ÇÖ. Kronik Hemotolojik Onkolojik Hastalığı Olan Çocukların Kardeşleri ve Annelerine Verilen Hemşirelik Desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2003 (Danışman: Doç. Dr. Suzan Yıldız), ve “Öner N. Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri, 3. Basım. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1997;365-371” kaynaklarından yararlanılmıştır.
